


PREVENCIÓN

- Evitar las relaciones sexuales con parejas múltiples.
- Practica el sexo seguro con una persona conocida y sana.
- Utilizar preservativos
- Los drogadictos deben evitar el uso compartido de agujas y jeringas
- Verificar que la sangre utilizada en transfusiones tenga sello de calidad nacional.



TRATAMIENTO

En la actualidad no hay tratamiento eficaz contra la infección VIH/SIDA. El tratamiento existente se limita a controlar las infecciones oportunistas causadas por virus, bacterias y hongos. Además la persona que depende esta enfermedad requiere apoyo psicosocial

RECUERDE :

EL SIDA ES UNA ENFERMEDAD MORTAL



CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA

La única vacuna que nos protege es la

PREVENCIÓN



Calle 17 Número 115-10

QUE ES EL VIH /SIDA?

Es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Se dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones.

• **Se transmite por la sangre, las relaciones sexuales sin protección, las agujas compartidas o reutilizadas, y de la madre infectada al bebé recién nacido durante el parto.**


• **No se transmite por** *Por lágrimas, sudor, tos, estornudos, alimentos, ropa, cubiertos, o por objetos de uso común.*

-*Por darse la mano, abrazarse o besarse profundamente.*

-*Por compartir duchas, lavabos o WC en piscinas, instalaciones deportivas, lugares de trabajo, colegios y establecimientos públicos.*

-*Por animales, mosquitos u otros insectos.*

-*Por donar o recibir sangre, en los países en los que la donación está adecuadamente controlada*



PERIODOS O ESTADOS CLINICOS

ESTADO 1

Infección Aguda, fiebre, inflamación de ganglios en el cuello y brote fino que desaparece de 3 a 5 días

ESTADO 2

Infección asintomática pero con pruebas serológicas positivas para el VIH

ESTADO 3

Presencia de múltiples ganglios inflamados en diferentes partes del cuerpo, por más de cuatro semanas de duración.

ESTADO 4

Presencia de infecciones oportunistas o neoplasias (tumores) asociadas como el sarcoma de kaposi, entre otros.

IMPACTOS DE LA INFECCION POR VIH/SIDA

EMOCIONAL

En los infectados y enfermos se presenta depresión, culpa, agresividad, abandono y modificación de hábitos de abandono y sueño.

SOCIAL

Hay desintegración de grupos de familias ocasionada por la pérdida, enfermedad o muerte de las personas que son eje económico, afectivo o normativo del grupo.

SALUD PUBLICA

Aumenta la frecuencia de mortalidad infantil, materna y de toda población general.

En la población laboral aumenta los días de incapacidad y frecuencia e invalidez

Para prevenirse del

SIDA



FIDELIDAD

Uno con una,
para toda la vida.