

Alergias a los medicamentos

Se reproduce con pequeñas cantidades del fármaco.

Es inmediata o puede manifestarse en días o semanas.

La más frecuente: Penicilina.

Aumenta posibilidad de alergia con uso frecuente, dosis altas, inyección ,comprimido.

¿Qué hacer en caso de presunta Alergia?

Apuntar nombre del medicamento.

Especial atención a fármacos tomados en ultimas cuatro semanas.

Siempre notificar tipo de reacción al Médico

Si signos, clínica grave

No dejar medicación al alcance de los niños.

IMPRESINDIBLE: Hacer pruebas de alergia.

Con los medicamentos
no se juega
ESTÁ EN TUS MANOS



Calle 17 Número 115-10

Teléfono: 4188822

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS



WWW.NEXOSCARGO.CO

¿QUE ES INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS?

Es toda intoxicación causada por el consumo de medicamentos .

- Puede ocurrir por:
- Consumo en exceso de medicamentos recetados por el medico.
- Consumo de medicamentos no recetados pro el medico.
- Consumo de medicamentos en mal estado.
- Consumo accidental (especialmente por niños).
- Alergias conocidas o desconocidas de algunos medicamentos o fármacos.
- Adicciones o usos no terapéuticos.



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA INTOXICACIÓN.

Las señales de alarma que indican que una persona está intoxicada dependen en gran medida del tipo de tóxico y la vía de entrada al organismo, así como de la sensibilidad de la víctima. Entre los síntomas de intoxicación o envenenamiento más generales solemos encontrarlos con:

- **Síntomas neurológicos,** como dolor de cabeza, pérdida de conciencia, estupor, somnolencia, confusión, convulsiones, mareos.
- **Síntomas respiratorios** como falta de aliento, tos, sensación de ahogo, dolor al inhalar.
- **Síntomas digestivos,** vómitos, diarrea, falta de apetito, náuseas, mal aliento (olor extraño o inusual, quemaduras en labios y boca.
- **Síntomas cutáneos** como erupciones en la piel, quemaduras, sensación de hormigueo en manos.

Síntomas generales: visión doble, fiebre, palpitaciones, labios azulados, irritabilidad, descontrol de los esfínteres, dolores generalizados.

COMO PREVENIR LA INTOXICACIÓN CON FÁRMACOS:

1. No deje los medicamentos en lugares donde puedan ser alcanzados por niños.

2. Verifique la fecha de vencimiento de los fármacos antes de consumirlos.
3. No se auto medique, ni acepte medicación de personal diferente al cuerpo medico.
4. Indique al medico las alergias que tiene.
5. Proteja los medicamentos en lugares protegidos de la luz, y la humedad.
6. Compre medicamentos solo en lugares adecuados para su comercialización.

QUE HACER EN CASO DE INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS.

1. Averiguar tipo, cantidad y hora lo más exacta posible.
2. Provocar vómito.
3. No provoque vomito si :
 - * El paciente esta inconsciente.
 - * El paciente convulsiona
 - * Lleva un tiempo mayor a 1 hora de su ingestión.
4. Consultar a un médico.
5. Si la persona esta inconsciente: Reanimación. **ABC.**